

CÓMO HABLAR CON TU MÉDICO ACERCA DE DUPIXENT

Si otros tratamientos tópicos recetados no te brindan el alivio que necesitas, este podría ser el momento de probar otra opción. DUPIXENT[®] (dupilumab) es un medicamento inyectable de venta con receta que se aplica debajo de la piel (inyección subcutánea), el cual ayuda a tratar tu eczema moderado a grave no controlado (dermatitis atópica). Conversa con tu médico sobre tus respuestas a las siguientes preguntas para ver si DUPIXENT es adecuado para ti.

- ▶ Si eres cuidador de un niño (de 6 meses a 11 años) o adolescente (de 12 a 17 años) con eczema, conversen juntos sobre estas preguntas y compartan las respuestas con su proveedor de atención médica.

HERRAMIENTAS PARA HABLAR SOBRE TUS SÍNTOMAS

El eczema puede ser complicado, y eso podría dificultar que los pacientes logren que sus seres queridos y médicos comprendan cómo es vivir con esta afección. Los síntomas podrían ser causados por muchos factores, pueden cambiar con el tiempo y tener un aspecto diferente en el tono de piel de cada persona.

En general, ¿qué tan molestos son tus síntomas? Considera compartir tu respuesta con tu médico.

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10

Nada molestos

Extremadamente molestos

¿Cómo afecta el eczema a tu piel? _____

TUS OBJETIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE TU ECZEMA

Mi esperanza para este tratamiento es _____



El eczema tiene un aspecto diferente en cada persona. Informa a tu médico si tienes partes rojas secas en la piel que te pican y que a veces supuran y se agrietan.



Toma fotos de tu piel durante un brote y compártelas con tu médico para ayudarle a comprender tus síntomas.

INDICACIÓN

DUPIXENT es un medicamento con receta utilizado para tratar a adultos y niños de 6 meses o más con eczema (dermatitis atópica o DA) moderado a grave que no puede controlarse correctamente con terapias recetadas sobre la piel (tópicas) o en casos que no se puedan utilizar terapias tópicas. DUPIXENT se puede usar con o sin corticosteroides tópicos. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños menores de 6 meses que tienen dermatitis atópica.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No utilice este medicamento si es alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT[®].

Por favor, consulte la Información de Seguridad Importante adicional sobre DUPIXENT de principio a fin.

Por favor, consulte la [Información completa de Prescripción](#) adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).



PREGUNTAS PARA HACERLE A TU MÉDICO

DUPIXENT es el primer tratamiento biológico de su tipo que puede ayudar a tratar de manera proactiva los síntomas del eczema desde adentro. Puedes hacerle estas preguntas a tu médico para saber si DUPIXENT es adecuado para ti o para tu hijo/a:

Acerca de DUPIXENT

- ¿Cómo puede DUPIXENT ayudar a mejorar mi picazón y lesiones?
- ¿Cómo actúa DUPIXENT de forma diferente?
- ¿Cuáles son los efectos secundarios comunes de DUPIXENT?

Dosificación

- ¿Cómo se toma DUPIXENT?
- ¿Dónde se inyecta DUPIXENT?
- ¿Cómo puedo capacitarme para dar las inyecciones de DUPIXENT y obtener apoyo para este proceso?

Apoyo

- ¿Qué tipo de apoyo está disponible para ayudarme durante mi tratamiento con DUPIXENT?
- ¿Cómo obtengo un suministro para mi receta para DUPIXENT?
- ¿Puedo obtener más información sobre el costo y la asistencia financiera para DUPIXENT?

Anota otros temas que tú y tus seres queridos quisieran discutir con tu médico: _____

¿Tienes más preguntas?

Puedes obtener asistencia individualizada y gratuita en español e inglés llamando a los Administradores de Casos de *DUPIXENT MyWay*[®] al **1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936).**

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

Antes de usar DUPIXENT, infórmele a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido lo siguiente:

- Si tiene problemas oculares.
- Si tiene una infección parasitaria (helmintos).
- Si tiene programado recibir algún tipo de vacuna. No debe recibir ninguna "vacuna viva" antes o durante el tratamiento con DUPIXENT.
- Si está embarazada o tiene planes de quedar embarazada. Se desconoce si DUPIXENT puede dañar al feto.
 - Un registro de embarazo para mujeres que toman DUPIXENT durante el embarazo recopila información sobre su salud y la del bebé. Para inscribirse u obtener más información, llame al 1-877-311-8972 o ingrese en <https://mothertobaby.org/ongoing-study/dupixent/>.
- Si está amamantando o tiene planes de amamantar. Se desconoce si DUPIXENT se trasmite a través de la leche materna.

Por favor, consulte la Información de Seguridad Importante adicional sobre DUPIXENT de principio a fin. Por favor, consulte la [Información completa de Prescripción](#) adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

Infórmele a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Sobre todo, infórmele a su proveedor de atención médica si está tomando medicamentos corticosteroides orales, tópicos o inhalados o si tiene dermatitis atópica y asma y usa un medicamento para el asma. **No** cambie ni interrumpa la administración del corticosteroide u otro medicamento para el asma sin hablar con su proveedor de atención médica. Esto puede provocar el regreso de otros síntomas que fueron controlados con el corticosteroide u otro medicamento para el asma.

DUPIXENT puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Reacciones alérgicas. DUPIXENT puede provocar reacciones alérgicas que algunas veces pueden ser fuertes.**
Deje de usar DUPIXENT e infórmele a su proveedor de atención médica o busque atención de emergencia de inmediato si tiene alguno de los siguientes signos o síntomas: Problemas respiratorios o sibilancias, hinchazón del rostro, los labios, la boca, la lengua o la garganta, desmayos, mareos, sensación de mareo, pulso acelerado, fiebre, urticaria, dolor en las articulaciones, malestar general, picazón, erupción cutánea, ganglios linfáticos inflamados, náuseas o vómitos, o calambres en el área del estómago.
- **Problemas oculares.** Dígale a su proveedor de atención médica si tiene nuevos problemas oculares o si nota un empeoramiento de los problemas que tenía, incluido el dolor ocular o cambios en la visión, como visión borrosa. Su proveedor de atención médica puede enviarlo a un oftalmólogo para que le realicen un examen, si es necesario.
- **Dolores en las articulaciones.** Algunas personas que usan DUPIXENT han tenido dificultades para caminar o moverse debido a los síntomas en sus articulaciones y, en algunos casos, debieron ser hospitalizadas. Infórmele a su proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma nuevo en las articulaciones o si empeoran los síntomas que tenía. Su proveedor de atención médica puede interrumpir el tratamiento con DUPIXENT si desarrolla síntomas en las articulaciones.

Los efectos secundarios más comunes en pacientes con eczema incluyen: Reacciones en el lugar de la inyección, inflamación de los ojos y los párpados, que incluyen enrojecimiento, hinchazón y picazón, a veces con visión borrosa, ojo seco, herpes en la boca o en los labios, y un alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia).

Infórmele a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de DUPIXENT. Llame a su médico para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios. Le recomendamos informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA).

Visite www.fda.gov/medwatch, o llame al 1-800-FDA-1088.

Utilice DUPIXENT exactamente como se lo recetó su proveedor de atención médica. Es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Su proveedor de atención médica decidirá si usted o su cuidador puede inyectar DUPIXENT. **No** intente preparar ni inyectar DUPIXENT hasta que su proveedor de atención médica le haya brindado capacitación a usted o su cuidador. En niños de 12 años o más, se recomienda que un adulto coloque o supervise la administración de DUPIXENT. En niños de 6 meses a menos de 12 años, un cuidador deberá administrar DUPIXENT.

Por favor, consulte la Información de Seguridad Importante adicional sobre DUPIXENT de principio a fin.
Por favor, consulte la [Información completa de Prescripción adjunta](#), incluida la [Información para el Paciente](#).

sanofi | **REGENERON**[®]

DUPIXENT[®] y DUPIXENT MyWay[®] son marcas registradas de Sanofi Biotechnology.

© 2024 Sanofi y Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados.

US.DUP.23.10.0325 Abril 2024