

## CÓMO HABLAR CON TU MÉDICO ACERCA DE DUPIXENT

Si otros tratamientos tópicos recetados no te brindan el alivio que necesitas, este podría ser el momento de probar otra opción. DUPIXENT<sup>®</sup> (dupilumab) es un medicamento inyectable de venta con receta que se aplica debajo de la piel (inyección subcutánea), el cual ayuda a tratar tu eczema moderado a grave no controlado (dermatitis atópica). Conversa con tu médico sobre tus respuestas a las siguientes preguntas para ver si DUPIXENT es adecuado para ti.

- ▶ Si eres cuidador de un niño (de 6 a 11 años) o adolescente (de 12 a 17 años) con eczema, conversen juntos sobre estas preguntas y compartan las respuestas con su proveedor de atención médica.

### HERRAMIENTAS PARA HABLAR SOBRE TUS SÍNTOMAS

El eczema puede ser complicado, y eso podría dificultar que los pacientes logren que sus seres queridos y médicos comprendan cómo es vivir con esta afección. Los síntomas podrían ser causados por muchos factores, pueden cambiar con el tiempo y tener un aspecto diferente en el tono de piel de cada persona.

**En general, ¿qué tan molestos son tus síntomas? Considera compartir tu respuesta con tu médico.**

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10

*Nada molestos*

*Extremadamente molestos*

¿Cómo afecta el eczema a tu piel? \_\_\_\_\_

### TUS OBJETIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE TU ECZEMA

Mi esperanza para este tratamiento es \_\_\_\_\_

#### INDICACIÓN

DUPIXENT es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos y niños de 6 años o más con dermatitis atópica (eczema) moderada a grave, que no puede controlarse correctamente con terapias recetadas que se aplican sobre la piel (tópicas) o en casos en los que no se puedan utilizar terapias tópicas. DUPIXENT puede utilizarse con o sin corticosteroides tópicos. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños menores de 6 años que tengan dermatitis atópica.

#### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

**No uses** este medicamento si eres alérgico al dupilumab o a alguno de los ingredientes en DUPIXENT<sup>®</sup>.

**Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional para DUPIXENT de principio a fin. Consulta la [Información de Prescripción](#) completa adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).**



El eczema tiene un aspecto diferente en cada persona. Informa a tu médico si tienes partes rojas secas en la piel que te pican y que a veces supuran y se agrietan.



Toma fotos de tu piel durante un brote y compártelas con tu médico para ayudarle a comprender tus síntomas.

## PREGUNTAS PARA HACERLE A TU MÉDICO

DUPIXENT es el primer tratamiento biológico de su tipo que puede ayudar a tratar de manera proactiva los síntomas del eczema desde adentro. Puedes hacerle estas preguntas a tu médico para saber si DUPIXENT es adecuado para ti o para tu hijo/a:

### Acerca de DUPIXENT

- ¿Cómo puede DUPIXENT ayudar a mejorar mi picazón y lesiones?
- ¿Cómo actúa DUPIXENT de forma diferente?
- ¿Cuáles son los efectos secundarios comunes de DUPIXENT?

### Dosificación

- ¿Cómo se toma DUPIXENT?
- ¿Dónde se inyecta DUPIXENT?
- ¿Cómo puedo capacitarme para dar las inyecciones de DUPIXENT y obtener apoyo para este proceso?

### Apoyo

- ¿Qué tipo de apoyo está disponible para ayudarme durante mi tratamiento con DUPIXENT?
- ¿Cómo obtengo un suministro para mi receta para DUPIXENT?
- ¿Puedo obtener más información sobre el costo y la asistencia financiera para DUPIXENT?

**Anota otros temas que tú y tus seres queridos quisieran discutir con tu médico:** \_\_\_\_\_

### ¿Tienes más preguntas?

**Puedes obtener asistencia individualizada y gratuita en español e inglés llamando a los Enfermeros Educadores de *DUPIXENT MyWay*<sup>®</sup> al 1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936).**

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

**Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluyendo:**

- Si tienes problemas oculares.
- Si tienes una infección parasitaria (helmintos).
- Si tienes programado recibir alguna vacuna. No debes recibir una “vacuna viva” antes o durante el tratamiento con DUPIXENT.
- Si estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si DUPIXENT dañará a tu bebé en gestación.
  - Un registro de embarazo para mujeres que usan DUPIXENT durante el embarazo recopila información sobre tu salud y la de tu bebé. Para inscribirte o para obtener más información, llama al 1-877-311-8972 o visita [https://mothertobaby.org/\\_ongoing-study/dupixent/](https://mothertobaby.org/_ongoing-study/dupixent/).
- Si estás amamantando o planeas amamantar. Se desconoce si DUPIXENT se transmite a través de la leche materna.

**Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional para DUPIXENT de principio a fin. Consulta la [Información de Prescripción](#) completa adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).**

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

Infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos los medicamentos de venta libre y de venta con receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Especialmente, infórmale a tu proveedor de atención médica si estás tomando medicamentos corticosteroides orales, tópicos o inhalados, o si tienes dermatitis atópica y asma y usas un medicamento para el asma. **No** cambies ni suspendas tu medicamento corticosteroide u otro medicamento para el asma sin hablar primero con tu proveedor de atención médica. Esto puede hacer que reaparezcan otros síntomas que fueron controlados por el medicamento corticosteroide u otro medicamento para el asma.

### **DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:**

- **Reacciones alérgicas. DUPIXENT puede causar reacciones alérgicas que algunas veces pueden ser graves.**

Deja de usar DUPIXENT e infórmale a tu proveedor de atención médica o busca atención de emergencia de inmediato si tienes alguno de los siguientes signos o síntomas: Problemas respiratorios o sibilancias, inflamación del rostro, los labios, la boca, la lengua o la garganta, desmayos, mareos, sensación de mareo, pulso acelerado, fiebre, urticaria, dolor en las articulaciones, malestar general, picazón, erupción cutánea, ganglios linfáticos inflamados, náuseas o vómitos, o calambres en el área del estómago.

- **Problemas oculares.** Infórmale a tu proveedor de atención médica si tienes problemas oculares nuevos o si notas un empeoramiento de los problemas que tenías, incluido dolor ocular o cambios en la visión, como visión borrosa. Tu proveedor de atención médica puede referirte a un oftalmólogo para que te realicen un examen de la vista, si es necesario.
- **Dolores en las articulaciones.** Algunas personas que usan DUPIXENT han tenido dificultades para caminar o moverse debido a los síntomas en sus articulaciones y, en algunos casos, debieron ser hospitalizados. Infórmale a tu proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma nuevo en las articulaciones o si empeoran los síntomas que tenías. Tu proveedor de atención médica puede interrumpir el tratamiento con DUPIXENT si desarrollas síntomas en las articulaciones.

**Los efectos secundarios más comunes en pacientes con dermatitis atópica son** reacciones en el lugar de la inyección, inflamación de los ojos y los párpados, que incluyen enrojecimiento, hinchazón y picazón, a veces con visión borrosa, y herpes en la boca o en los labios.

Infórmale a tu proveedor de atención médica si sufres algún efecto secundario que te cause malestar o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de DUPIXENT. Llama a tu médico para obtener consejos médicos sobre los efectos secundarios. Te recomendamos informar sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA). Visita [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llama al 1-800-FDA-1088.

Usa DUPIXENT exactamente según lo prescrito por tu proveedor de atención médica. DUPIXENT es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Tu proveedor de atención médica decidirá si tú o tu cuidador pueden inyectar DUPIXENT. **No** intentes preparar e inyectar DUPIXENT hasta que tú o tu cuidador hayan sido capacitados por tu proveedor de atención médica. En niños de 12 años o más, se recomienda que DUPIXENT sea administrado por un adulto o bajo la supervisión de un adulto. En niños menores de 12 años, un cuidador deberá administrar DUPIXENT.

**Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional para DUPIXENT de principio a fin. Consulta la [Información de Prescripción completa adjunta, incluida la Información para el Paciente.](#)**

**SANOFI GENZYME**  **REGENERON**

DUPIXENT<sup>®</sup> y DUPIXENT MyWay<sup>®</sup> son marcas registradas de Sanofi Biotechnology.

© 2022 Sanofi y Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados.

DUP.21.05.0059 Enero, 2022