

# CÓMO HABLAR CON EL ESPECIALISTA EN ECZEMA DE TU HIJO ACERCA DE DUPIXENT

**DUPIXENT**<sup>®</sup>  
(dupilumab) Inyección  
200mg · 300mg

Crecer con eczema (dermatitis atópica) moderado a grave no controlado puede ser difícil para niños y jóvenes de 6 a 17 años. La imprevisibilidad de los brotes puede suponer un reto. Y, si bien cuidar a un niño con eczema tiene sus propias dificultades, DUPIXENT (disponible para niños y jóvenes de 6 a 17 años) puede ayudar a controlar los síntomas de eczema incluso cuando la piel parece estar sana. Es una diferencia que tu hijo puede sentir a la perfección.

Usa la siguiente información a modo de ayuda para iniciar una conversación con tu médico sobre si DUPIXENT es adecuado para tu hijo.

## QUÉ COMPARTIR

Para aprovechar al máximo las consultas con el médico de tu hijo, es importante que te sinceres sobre cómo le afecta el eczema.

En tu opinión, ¿qué tan grave es el eczema de tu hijo? (Escala: 1 = para nada grave, 10 = extremadamente grave)

①    ②    ③    ④    ⑤    ⑥    ⑦    ⑧    ⑨    ⑩

¿Hace cuánto tiempo que tu hijo padece eczema?

---

¿Qué tratamiento(s) recibe actualmente tu hijo?

---

¿Con qué frecuencia tiene un brote tu hijo?

Menos de una vez al mes       1 o 2 veces al mes       Más de dos veces al mes

¿Cuánto suelen durar los brotes de tu hijo?

De 1 a 5 días       De 5 a 10 días       De 10 a 15 días       Más de 15 días

¿Cómo afecta el eczema a tu hijo?

---

## QUÉ PREGUNTAR

### Acerca de DUPIXENT

- ¿Podría DUPIXENT ayudar a mi hijo (de 6 a 17 años)?
- ¿Qué resultados has observado en niños y jóvenes que reciben DUPIXENT?
- ¿Cuáles son los efectos secundarios de DUPIXENT?

**Pregúntale al especialista en eczema de tu hijo si DUPIXENT es adecuado para él.**

### Administración de la dosis

- ¿Cómo se usa DUPIXENT?
- ¿Con qué frecuencia mi hijo necesitaría usar DUPIXENT?

### Asistencia

- ¿Existen programas que ayuden a cubrir el costo de DUPIXENT?
- ¿Cómo han manejado otros pacientes el proceso de inyección?
- ¿Cómo surto una receta para DUPIXENT?

## INDICACIÓN

DUPIXENT es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a personas de 6 años o más con dermatitis atópica (eczema) moderada a grave, que no puede controlarse correctamente con terapias recetadas aplicadas sobre la piel (tópicas) o en casos en los que no se puedan utilizar terapias tópicas. DUPIXENT puede utilizarse con o sin corticoesteroides tópicos. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños menores de 6 años que tienen dermatitis atópica.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

**No utilices este medicamento** si eres alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT<sup>®</sup>.

**Consulta la Información importante de seguridad adicional sobre DUPIXENT en la página siguiente. Consulta toda la Información de prescripción adjunta, incluida la Información para el paciente.**

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

**Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluido lo siguiente:**

- Si tienes problemas oculares.
- Si tienes una infección parasitaria (helmintos).
- Si tienes programado recibir algún tipo de vacuna. No debes recibir ninguna "vacuna viva" si recibes tratamiento con DUPIXENT.
- Si estás embarazada o tienes planes de quedar embarazada. Se desconoce si DUPIXENT puede dañar al feto.
  - Hay un registro de exposición en el embarazo para mujeres que reciben inyecciones de DUPIXENT durante el embarazo diseñado para recopilar información sobre tu salud y la del bebé. Tu proveedor de atención médica puede inscribirte o puedes hacerlo por tu cuenta. Para obtener más información sobre el registro, llama al 1-877-311-8972 o ingresa en <https://mothertobaby.org/ongoing-study/dupixent/>.
- Si estás amamantando o tienes planes de amamantar. Se desconoce si DUPIXENT se transmite a través de la leche materna.

Dile a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos los medicamentos de venta libre y de venta con receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Sobre todo, infórmale a tu proveedor de atención médica si estás tomando medicamentos corticosteroides orales, tópicos o inhalados, o si tienes dermatitis atópica y asma y usas un medicamento para el asma. **No** cambies ni suspendas la administración del corticoesteroide u otro medicamento para el asma sin hablar con tu proveedor de atención médica. Esto puede provocar el regreso de otros síntomas que fueron controlados con los corticosteroides u otro medicamento para el asma.

**DUPIXENT puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:**

- **Reacciones alérgicas (hipersensibilidad), incluida una reacción fuerte conocida como anafilaxia.** Deja de usar DUPIXENT e infórmale a tu proveedor de atención médica o busca atención de emergencia de inmediato si tienes alguno de los siguientes síntomas: problemas respiratorios, fiebre, malestar general, ganglios linfáticos inflamados, inflamación de rostro, boca y lengua, urticaria, picazón, desmayos, mareos, sensación de mareo (presión arterial baja), dolor en las articulaciones o erupción cutánea.
- **Problemas oculares.** Dile a tu proveedor de atención médica si tienes nuevos problemas oculares o si notas un empeoramiento de los problemas que tenías, incluido el dolor ocular o cambios en la visión.

**Los efectos secundarios más comunes en pacientes con dermatitis atópica son** reacciones en el lugar de la inyección, inflamación de los ojos y los párpados, que incluyen enrojecimiento, hinchazón y picazón, y herpes en la boca o los labios.


Infórmale a tu proveedor de atención médica si tienes algún efecto secundario que te moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de DUPIXENT. Llama a tu médico para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios. Te recomendamos informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visita [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llama al 1-800-FDA-1088.

Utiliza DUPIXENT exactamente como se te recetó. Tu proveedor de atención médica te dirá cuánto DUPIXENT debes inyectarte y con qué frecuencia debes hacerlo. DUPIXENT es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Si tu proveedor de atención médica decide que tú o un cuidador pueden administrar las inyecciones de DUPIXENT, tú o tu cuidador deben recibir capacitación sobre la manera correcta de preparar e inyectar DUPIXENT. **No** intentes inyectarte DUPIXENT hasta que tu proveedor de atención médica te haya mostrado la manera correcta de hacerlo. En niños de 12 años o más, se recomienda que un adulto coloque o supervise la administración de DUPIXENT. En niños menores de 12 años, un cuidador debe administrar DUPIXENT.

**Consulta toda la [Información de prescripción adjunta](#), incluida la [Información para el paciente](#).**

SANOFI GENZYME  **REGENERON**

DUPIXENT® y DUPIXENT MyWay® son marcas comerciales registradas de Sanofi Biotechnology.  
© 2021 Sanofi y Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados.  
DUP.21.02.0300 03/21

**DUPIXENT®**   
(dupilumab) Inyección  
200mg · 300mg