

## TENGA UNA CONVERSACIÓN SOBRE DUPIXENT PARA LA ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA (EoE)

DUPIXENT es un tratamiento biológico revolucionario disponible para pacientes con EoE a partir de 12 años que pesen al menos 88 libras (40 kilos). DUPIXENT está reconocido por la FDA como un tratamiento innovador de la EoE. DUPIXENT actúa sobre una fuente subyacente de inflamación, que es una de las causas de la EoE. Se ha demostrado que DUPIXENT reduce la dificultad para tragar.\*

### INFÓRMESE BIEN PARA PREPARARSE PARA SU CITA

Tómese un momento para **obtener más información acerca de la EoE y cómo DUPIXENT puede ayudar a controlar los síntomas de la EoE**. Sentirse informado puede ayudarle a sentir confianza para hablar con su médico.



Las personas con EoE tienen inflamación en el esófago. La EoE es una enfermedad crónica que puede empeorar con el tiempo, dañando el esófago.



DUPIXENT es el único tratamiento aprobado por la FDA para la EoE. DUPIXENT redujo los eosinófilos en el esófago, que contribuyen a la inflamación.\*



**Los efectos secundarios más frecuentes en los pacientes con EoE incluyen** reacciones en el lugar de inyección, infecciones de las vías respiratorias superiores, herpes labial en la boca o en los labios y dolor articular (artralgia).

\*Basado en ensayos clínicos con 240 pacientes adultos y pediátricos (mayores de 12 años) con un peso mínimo de 88 libras y EoE en la semana 24.

### REFLEXIONE ACERCA DE SU EXPERIENCIA

Rellene esta guía de discusión con el médico y llévela a su próxima cita para ayudarle a determinar si DUPIXENT puede ser adecuado para usted. Si es usted el cuidador de un adolescente (de 12 a 17 años) con EoE, respondan juntos a estas preguntas para compartirlas con su médico.

#### 1 SUS SÍNTOMAS DE EoE

Aunque las estrategias de control de la EoE le hayan ayudado a salir adelante, es importante que comente con su médico cómo le siguen afectando los síntomas.

Marque las opciones que mejor describan los síntomas de EoE que tiene:

- Dificultad o dolor al tragar (disfagia)       Asfixia       Sensación de comida atascada (impactación)  
 Sensación de que la comida vuelve a subir       Otro: \_\_\_\_\_

### INDICACIÓN

DUPIXENT es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos y niños de 12 años o más que pesan al menos 88 libras (40 kg), con esofagitis eosinofílica (EE). Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños menores de 12 años que tienen esofagitis eosinofílica y que pesan al menos 88 libras (40 kg).

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD E INDICACIÓN

**No uses** este medicamento si eres alérgico al dupilumab o a alguno de los ingredientes en DUPIXENT<sup>®</sup>.

Consulte la **demás Información importante de seguridad de DUPIXENT en el resto del documento**.  
Consulte la **Información de Prescripción completa adjunta, incluida la Información para el Paciente**.



**¿Con qué frecuencia tiene síntomas de la EoE?**

- Varias veces al año       Todos los meses       Todas las semanas       Todos los días  
 Otro (por ej. "2 veces por semana"): \_\_\_\_\_

**¿Con qué frecuencia evita alimentos por miedo a atragantarse o a tener otros síntomas?**

- Varias veces al año       Todos los meses       Todas las semanas       Todos los días  
 Otro (por ej. "2 veces por semana"): \_\_\_\_\_

**Describe el impacto emocional de vivir con sus síntomas de EoE:**

---

---

**2 SU PLAN ACTUAL DE TRATAMIENTO DE LOS SÍNTOMAS**

Asegúrese de informar a su médico de todos los medicamentos y estrategias que usa para tratar los síntomas de la EoE.

**Informe a su médico si ha realizado alguna de las siguientes acciones para tratar de controlar sus síntomas de EoE en el último año:**

- Modificar alimentos (como poner ingredientes en la batidora)     Añadir salsas a los alimentos     Comer despacio  
 Beber agua para bajar la comida     Evitar ciertos alimentos: \_\_\_\_\_  
 Hacer otra cosa: \_\_\_\_\_

**Anote con qué frecuencia usa estas estrategias y si está satisfecho con el nivel de control de los síntomas que le han proporcionado:**

---

**Si actualmente toma inhibidores de la bomba de protones (también conocidos como IBP o reductores de ácidos estomacales), ¿sigue teniendo ardor o acidez de estómago?**

- Sí       No       Actualmente no estoy tomando IBP

**Haga una lista de los medicamentos u otras estrategias que ha probado para controlar los síntomas de la EoE:**

*Nombre del medicamento o estrategia:    Anote la frecuencia con la que toma cada medicamento o usa cada estrategia.*

---

---

---

---

**INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD E INDICACIÓN (continuación)**

**Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluyendo:**

- Si tienes una infección parasitaria (helmintos).
- Si tienes programado recibir alguna vacuna. No debes recibir una "vacuna viva" antes o durante el tratamiento con DUPIXENT.

**Consulte la demás Información importante de seguridad de DUPIXENT en el resto del documento.**

**Consulte la Información de Prescripción completa adjunta, incluida la Información para el Paciente.**





## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD E INDICACIÓN (continuación)

Infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos los medicamentos de venta libre y de venta con receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

**En especial, infórmale a tu proveedor de atención médica si** estás tomando medicamentos corticosteroides orales, tópicos o inhalados, o si tienes esofagitis eosinofílica y asma y usas un medicamento para el asma. **No** cambies ni suspendas tu medicamento corticosteroide u otro medicamento para el asma sin hablar primero con tu proveedor de atención médica. Esto puede provocar el regreso de otros síntomas que fueron controlados con el corticosteroide u otro medicamento para el asma.

### **DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:**

- **Reacciones alérgicas. DUPIXENT puede causar reacciones alérgicas que algunas veces pueden ser graves.** Deja de usar DUPIXENT e infórmale a tu proveedor de atención médica o busca atención de emergencia de inmediato si tienes alguno de los siguientes signos o síntomas: problemas respiratorios o sibilancias, inflamación del rostro, los labios, la boca, la lengua o la garganta, desmayos, mareos, sensación de mareo, pulso acelerado, fiebre, urticaria, dolor en las articulaciones, malestar general, picazón, erupción cutánea, ganglios linfáticos inflamados, náuseas o vómitos, o calambres en el área del estómago.
- **Dolores en las articulaciones.** Algunas personas que usan DUPIXENT han tenido dificultades para caminar o moverse debido a los síntomas en sus articulaciones y, en algunos casos, debieron ser hospitalizadas. Infórmale a tu proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma nuevo en las articulaciones o si empeoran los síntomas que tenías. Tu proveedor de atención médica puede interrumpir el tratamiento con DUPIXENT si desarrollas síntomas en las articulaciones.

**Los efectos secundarios más comunes en pacientes con esofagitis eosinofílica son** reacciones en el lugar de la inyección, infecciones del tracto respiratorio superior, herpes en la boca o en los labios y dolor en las articulaciones (artralgia).

Infórmale a tu proveedor de atención médica si sufres algún efecto secundario que te cause malestar o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de DUPIXENT. Llama a tu médico para obtener consejos médicos sobre los efectos secundarios. Te recomendamos informar sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA). Visita [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llama al 1-800-FDA-1088.

Usa DUPIXENT exactamente según lo prescrito por tu proveedor de atención médica. DUPIXENT es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Tu proveedor de atención médica decidirá si tú o tu cuidador pueden inyectar DUPIXENT. **No** intentes preparar e inyectar DUPIXENT hasta que tú o tu cuidador hayan sido capacitados por tu proveedor de atención médica. En niños de 12 años o más, se recomienda que DUPIXENT sea administrado por un adulto o bajo la supervisión de un adulto.

**Consulta la Información de Prescripción completa adjunta, incluida la Información para el Paciente.**