



FORMAS DE HABLAR CON TU MÉDICO SOBRE DUPIXENT

La vida con asma moderada a grave no controlada puede ser difícil. Usa esta guía para hablar con tu médico o el médico de tu hijo/a sobre cómo DUPIXENT podría ayudar a manejar los síntomas. Si el apoyo de tus seres queridos te ayuda a sentirte más cómodo al hablar sobre DUPIXENT, revisen juntos esta página y anoten preguntas adicionales para tu próxima cita.

► Si tu niño (de 6 a 11 años) o adolescente (de 12 a 17 años) tiene asma, pueden responder juntos estas preguntas y compartir sus pensamientos con su proveedor de atención médica.

COMPARTE EL IMPACTO

¿Con qué síntomas de asma tú o tu ser querido tienen que lidiar todavía, incluso con los tratamientos actuales? Marquen todas las opciones que correspondan.

- Dificultad para respirar
- Tos
- Opresión en el pecho
- Despertarse por las noches
- Ataques de asma
- Otros: _____



IDEAS PARA INCLUIR A TUS SERES QUERIDOS

Antes de hablar con tu médico sobre DUPIXENT:

- Agradécele a tu ser querido por escuchar y hazle saber que su opinión es importante para ti
- Pregúntale a tu ser querido si tiene alguna pregunta, inquietud o idea para compartir con tu médico

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITA [DUPIXENT.COM/ASTHMA/ESPANOL](https://www.dupixent.com/asthma/espagnol)

INDICACIÓN

DUPIXENT es un medicamento de venta con receta que se utiliza junto con otros medicamentos para el asma para el tratamiento de mantenimiento del asma eosinofílica o asma dependiente de corticosteroide orales moderada a grave en adultos y niños de 6 años de edad o más, cuya asma no se encuentra bajo control con sus medicamentos para el asma actuales. DUPIXENT ayuda a prevenir ataques (exacerbaciones) severos de asma y puede mejorar la respiración. DUPIXENT también podría ayudar a reducir la cantidad de corticosteroides orales que necesitas y, a la vez, prevenir los ataques severos de asma y mejorar la respiración. **DUPIXENT no se utiliza** para aliviar problemas respiratorios repentinos y no sustituye a un medicamento inhalado de rescate. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños de menos de 6 años que tengan asma.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No utilices este medicamento si eres alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT[®].

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad de DUPIXENT en la página siguiente.

Por favor, consulta la [Información de Prescripción](#) completa adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).



¿POR QUÉ ESTÁS CONSIDERANDO USAR DUPIXENT?

Ejemplo: Incluso con mis tratamientos actuales, el asma moderada a grave no controlada dificulta mis actividades diarias. Con un mejor control, podría volver a ser más activo.

ANOTA OTROS TEMAS PARA CONVERSAR CON TU MÉDICO:

► ¿Tienes más preguntas?

Puedes llamar a los Enfermeros Educadores de **DUPIXENT MyWay**[®] al **1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936)**, opción 2, para obtener apoyo individualizado en español.



PREGÚNTALE A TU MÉDICO

- ¿Cómo podría DUPIXENT ayudar a controlar los síntomas del asma?
- ¿Cómo DUPIXENT trabaja diferente en comparación con mis tratamientos actuales?
- ¿Qué resultados han tenido otros pacientes mientras usan DUPIXENT?
- ¿Cómo comienzo a usar DUPIXENT?
- ¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios más comunes de DUPIXENT?

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITA [DUPIXENT.COM/ASTHMA/ESPANOL](https://www.dupixent.com/asthma/espagnol)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluyendo:

- si tienes una infección parasitaria (helminto)
- si tienes programado recibir alguna vacuna. No debes recibir una “vacuna viva” justo antes y durante el tratamiento con DUPIXENT.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

- si estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si DUPIXENT dañará a tu bebé en gestación.
 - Un registro de embarazos para mujeres que usan DUPIXENT durante el embarazo recopila información sobre tu salud y la de tu bebé.
- si estás amamantando o planeas amamantar. Se desconoce si DUPIXENT se transmite a través de la leche materna.

Informa a tu proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Especialmente, informa a tu proveedor de atención médica si estás usando medicamentos corticosteroides orales, tópicos o inhalados o si usas un medicamento para el asma. **No** cambies ni suspendas tus otros medicamentos, incluido el medicamento corticosteroide u otro medicamento para el asma, sin hablar con tu proveedor de atención médica. Esto puede hacer que reaparezcan otros síntomas que fueron controlados por esos medicamentos.

DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Reacciones alérgicas. DUPIXENT puede causar reacciones alérgicas, incluidas reacciones en la piel, que algunas veces pueden ser graves.** Deja de usar DUPIXENT e infórmale a tu proveedor de atención médica o busca atención de emergencia de inmediato si presentas alguno de los siguientes signos o síntomas: problemas respiratorios o sibilancias, inflamación del rostro, los labios, la boca, la lengua o la garganta, desmayos, mareos, sensación de mareo, pulso acelerado, fiebre, urticaria, erupción cutánea, incluyendo erupción con aspecto de ojo de buey o dolorosas protuberancias rojas o azules bajo la piel, malestar general, picazón, ganglios linfáticos inflamados, náuseas o vómitos, dolor en las articulaciones o calambres en el área del estómago.
- **Inflamación de los vasos sanguíneos.** En ocasiones poco frecuentes, esto puede ocurrir en personas con asma que reciben DUPIXENT. Puede suceder en personas que también toman un medicamento esteroide por vía oral y se suspende el medicamento o se reduce la dosis. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si presentas lo siguiente: erupción cutánea, dolor en el pecho, falta de aliento que empeora, orina de color marrón u oscuro, fiebre persistente, o una sensación de alfileres y agujas o adormecimiento de los brazos o las piernas.
- **Psoriasis.** Esto puede ocurrir en personas con asma que reciben DUPIXENT. Informa a tu proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma nuevo en la piel. Tu proveedor de atención médica podría remitirte a un dermatólogo para que te examine, si es necesario.
- **Molestias y dolor en las articulaciones.** Algunas personas que usan DUPIXENT han tenido dificultades para caminar o moverse debido a los síntomas en sus articulaciones y, en algunos casos, debieron ser hospitalizadas. Infórmale a tu proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma en las articulaciones nuevo o que empeore. Tu proveedor de atención médica podría interrumpir el tratamiento con DUPIXENT si desarrollas síntomas en las articulaciones.

Los efectos secundarios más comunes en pacientes con asma incluyen reacciones en el lugar de la inyección, alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia), dolor de garganta (dolor orofaríngeo) e infecciones parasitarias (helminths).

Infórmale a tu proveedor de atención médica si sufres algún efecto secundario que te cause malestar o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de DUPIXENT. Llama a tu médico para obtener consejos médicos sobre los efectos secundarios. Te recomendamos informar sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA). Visita www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088.

Usa DUPIXENT exactamente como te lo recetó tu proveedor de atención médica. DUPIXENT es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Tu proveedor de atención médica decidirá si tú o tu cuidador pueden inyectar DUPIXENT. **No** intentes preparar e inyectar DUPIXENT hasta que tú o tu cuidador hayan sido capacitados por tu proveedor de atención médica. En niños de 12 años o más, se recomienda que un adulto coloque o supervise la administración de DUPIXENT. A niños de 6 a menos de 12 años, un cuidador debe administrarles DUPIXENT.

Por favor, consulta la [Información de Prescripción completa adjunta](#), incluida la [Información para el Paciente](#).