

# ES HORA DE HABLAR CON TU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LOS PÓLIPOS NASALES

DUPIXENT es un medicamento de venta con receta que se utiliza junto con otros medicamentos para el tratamiento de mantenimiento de la rinosinusitis crónica con poliposis nasal (RSCcPN) en adultos (18 años de edad o más) cuya afección no se encuentra bajo control.

Vivir con pólipos nasales puede ser difícil. DUPIXENT es el primer medicamento biológico aprobado por la FDA para la RSCcPN y no es un inmunosupresor ni un esteroide. Habla con tu proveedor de atención médica sobre cómo DUPIXENT podría ayudarte a manejar tus síntomas. Una conversación productiva puede ser el primer paso para encontrar el tratamiento adecuado para ti.

## 1 HABLA DE TUS SÍNTOMAS

¿Con qué frecuencia los siguientes síntomas afectan tu vida diaria?

	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Frecuentemente	Otra
Dificultad para quedarte dormido	<input type="checkbox"/> _____				
Dolor y presión faciales	<input type="checkbox"/> _____				
Cansancio	<input type="checkbox"/> _____				
Congestión nasal	<input type="checkbox"/> _____				
Dificultad para respirar por la nariz	<input type="checkbox"/> _____				

¿Se ha visto afectado tu sentido del olfato?

Sí  No

## INDICACIÓN

DUPIXENT es un medicamento de venta con receta que se utiliza junto con otros medicamentos para el tratamiento de mantenimiento de la rinosinusitis crónica con poliposis nasal (RSCcPN) en adultos cuya afección no se encuentra bajo control. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños de menos de 18 años de edad que tengan rinosinusitis crónica con poliposis nasal.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

**No uses** este medicamento si eres alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT<sup>®</sup>.

Por favor, consulta la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

**¿Padeces alguna de las siguientes afecciones?**

Asma moderada a grave no controlada

Eczema (dermatitis atópica) moderado a grave no controlado

Esofagitis eosinofílica (EE)



**Pregúntale a tu proveedor de atención médica:  
¿TENGO PÓLIPOS NASALES NO CONTROLADOS?**

**2 TRATAMIENTOS ACTUALES**

Si tienes problemas para manejar tus síntomas, habla con tu proveedor de atención médica sobre tus opciones de tratamiento para ver si hay una opción más adecuada para ti.

**¿Cuál de los siguientes tratamientos estás usando actualmente para manejar tus síntomas?**

Antibióticos

Lavados salinos

Esteroides nasales

Esteroides orales



**Pregúntale a tu proveedor de atención médica:  
¿CÓMO FUNCIONA DUPIXENT DE MANERA DIFERENTE A MIS OTROS TRATAMIENTOS?**

**¿Cuántas veces en el último año te han recetado esteroides orales?**

0 veces

1-2 veces

3-4 veces

4 o más veces

**¿Con qué frecuencia usas un aerosol nasal?**

Nunca

Diariamente

Otra: \_\_\_\_\_

**¿Cuántas veces te has sometido a cirugía por pólipos nasales?**

0 veces

1-2 veces

3-4 veces

4 o más veces

**INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)**

**Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluyendo:**

- si tienes problemas oculares.
- si tienes una infección parasitaria (helminto).
- si tienes programado recibir alguna vacuna. No debes recibir una "vacuna viva" justo antes y durante el tratamiento con DUPIXENT.

Por favor, consulta la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

### 3 TU VIDA CON PÓLIPOS NASALES

Describe el impacto emocional de vivir con tus síntomas de RSCcPN:

¿Qué actividades cotidianas desearías hacer más si tuvieras menos pólipos nasales?

¿Te interesaría aprender más sobre un medicamento biológico?

- Sí       No



**Pregúntale a tu proveedor de atención médica:  
¿CÓMO PUEDO EMPEZAR EL TRATAMIENTO CON DUPIXENT?**

### COMIENZA TU RECORRIDO CON DUPIXENT

Lleva este formulario al consultorio y pregúntale a tu proveedor de atención médica sobre DUPIXENT. Si tienes más preguntas antes de tu cita, puedes llamar al equipo de apoyo de *DUPIXENT MyWay*<sup>®</sup> al **1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936)**, opción 2.

#### OBTÉN INFORMACIÓN SOBRE DUPIXENT

Visita [DUPIXENT.com](https://dupixent.com) para obtener más información sobre cómo DUPIXENT podría ayudarte a manejar tus síntomas de RSCcPN.



### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluyendo (cont.):

- si estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si DUPIXENT dañará a tu bebé en gestación.
  - Un registro de embarazos para mujeres que usan DUPIXENT durante el embarazo recopila información sobre tu salud y la de tu bebé. Para inscribirte o para obtener más información, llama al 1-877-311-8972 o visita <https://mothertobaby.org/ongoing-study/dupixent/>.
- si estás amamantando o planeas amamantar. Se desconoce si DUPIXENT se transmite a través de la leche materna.

Informa a tu proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos los medicamentos de venta libre y de venta con receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Por favor, consulta la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).



## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

**Especialmente, informa a tu proveedor de atención médica si** estás tomando corticosteroides orales, tópicos o inhalados o si tienes rinosinusitis crónica con poliposis nasal (RSCcPN) y asma y usas un medicamento para el asma. **No** cambies ni suspendas tu medicamento corticosteroide u otro medicamento para el asma sin hablar primero con tu proveedor de atención médica. Esto puede hacer que reaparezcan otros síntomas que fueron controlados por el medicamento corticosteroide u otro medicamento para el asma.

### **DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:**

- **Reacciones alérgicas.** DUPIXENT puede causar reacciones alérgicas que algunas veces pueden ser graves. Deja de usar DUPIXENT e infórmale a tu proveedor de atención médica o busca atención de emergencia de inmediato si presentas alguna de las siguientes señales o síntomas: problemas respiratorios o sibilancias, inflamación del rostro, los labios, la boca, la lengua o la garganta, desmayos, mareos, sensación de mareo, pulso acelerado, fiebre, urticaria, dolor en las articulaciones, malestar general, picazón, erupción cutánea, ganglios linfáticos inflamados, náuseas o vómitos, o calambres en el área del estómago.
- **Problemas oculares.** Infórmale a tu proveedor de atención médica si tienes problemas oculares nuevos o si notas un empeoramiento de los problemas que tenías, incluido dolor ocular o cambios en la visión, como visión borrosa. Tu proveedor de atención médica puede referirte a un oftalmólogo para que te realicen un examen de la vista, si es necesario.
- **Inflamación de los vasos sanguíneos.** En ocasiones poco frecuentes, esto puede ocurrir en personas con asma que reciben DUPIXENT. Puede suceder en personas que también toman un medicamento esteroide por vía oral y se suspende el medicamento o se reduce la dosis. Se desconoce si esto es causado por DUPIXENT. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes lo siguiente: erupción cutánea, dolor en el pecho, falta de aliento que empeora, sensación de alfileres y agujas o adormecimiento de los brazos o las piernas, o fiebre persistente.
- **Dolor en las articulaciones.** Algunas personas que usan DUPIXENT han tenido dificultades para caminar o moverse debido a los síntomas en sus articulaciones y, en algunos casos, debieron ser hospitalizados. Infórmale a tu proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma en las articulaciones nuevo o que empeore. Tu proveedor de atención médica podría interrumpir el tratamiento con DUPIXENT si desarrollas síntomas en las articulaciones.

### **Los efectos secundarios más comunes en pacientes con rinosinusitis crónica con poliposis nasal incluyen**

reacciones en el lugar de la inyección, inflamación de los ojos y los párpados, que incluyen enrojecimiento, hinchazón y picazón, a veces con visión borrosa, un alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia), dificultad para dormir (insomnio), dolor dental, gastritis y dolor en las articulaciones (artralgia).

Infórmale a tu proveedor de atención médica si sufres algún efecto secundario que te cause malestar o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de DUPIXENT. Llama a tu médico para obtener consejos médicos sobre los efectos secundarios. Te recomendamos informar sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA). Visita [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llama al 1-800-FDA-1088.

Usa DUPIXENT exactamente según lo prescrito por tu proveedor de atención médica. DUPIXENT es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Tu proveedor de atención médica decidirá si tú o tu cuidador pueden inyectar DUPIXENT. **No** intentes preparar e inyectar DUPIXENT hasta que tú o tu cuidador hayan sido capacitados por tu proveedor de atención médica.

**Por favor, consulta la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).**