

¡Obtenga más información sobre cómo DUPIXENT puede ser adecuado para usted!

Únase a nosotros desde la comodidad de su propio hogar en un evento educativo GRATIS para el paciente, a fin de obtener información sobre DUPIXENT como opción de tratamiento y más para las siguientes afecciones no controladas:

- eczema moderado a grave (dermatitis atópica) (mayores de 6 meses);
- asma eosinofílica o asma dependiente de corticosteroides orales (OCS) moderadas a graves (mayores de 6 años);
- rinosinusitis crónica con poliposis nasal (RSCcPN) (mayores de 18 años).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No utilice este medicamento si es alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT[®].

Consulte todas las indicaciones y la información de seguridad importante adicional que está a continuación.

Haga clic a continuación para ver una lista completa de opciones de programas para:

- [Dermatitis atópica](#)
- [Asma eosinofílica o dependiente de OCS](#)
- [RSCcPN](#)

INDICACIONES

DUPIXENT es un medicamento con receta utilizado para lo siguiente:

- **Tratar a adultos y niños de 6 meses o más con eczema (dermatitis atópica o DA) moderado a grave, que no puede controlarse correctamente con terapias recetadas que se aplican sobre la piel (tópicas) o en casos en los que no se puedan utilizar terapias tópicas. DUPIXENT puede utilizarse con o sin corticosteroides tópicos. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños menores de 6 meses que tienen dermatitis atópica.**
- **Con otros medicamentos para el asma para el tratamiento de mantenimiento del asma eosinofílico o asma dependiente de esteroides orales moderado a grave en adultos y niños de 6 años o más cuyo asma no se encuentra controlado con sus medicamentos para el asma actuales. DUPIXENT permite prevenir ataques (exacerbaciones) graves de asma y puede mejorar la respiración. DUPIXENT también puede ayudar a reducir la cantidad de corticosteroides orales que necesita y, a la vez, prevenir los ataques graves de asma y mejorar la respiración. DUPIXENT no se utiliza para tratar problemas respiratorios repentinos. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños menores de 6 años que tienen asma.**
- **Con otros medicamentos para el tratamiento de mantenimiento de la rinosinusitis crónica con poliposis nasal (RSCcPN) en adultos cuya enfermedad no esté controlada. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños menores de 18 años que tienen rinosinusitis crónica con poliposis nasal.**
- **Tratar a adultos y niños de 12 años o más con esofagitis eosinofílica (EoE) que pesan, por lo menos, 88 libras (40 kg). Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños menores de 12 años que tienen esofagitis eosinofílica y pesan, por lo menos, 88 libras (40 kg).**
- **Tratar a adultos con prurigo nodular (PN). Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños menores de 18 años con prurigo nodular.**

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No utilice este medicamento si es alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT[®].

Antes de usar DUPIXENT, infórmele a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido lo siguiente:

- Si tiene problemas oculares.
- Si tiene una infección parasitaria (helmintos).
- Si tiene programado recibir algún tipo de vacuna. No debe recibir ninguna "vacuna viva" antes o durante el tratamiento con DUPIXENT.
- Si está embarazada o tiene planes de quedar embarazada. Se desconoce si DUPIXENT puede dañar al feto.
 - o Un registro de embarazo para mujeres que toman DUPIXENT durante el embarazo recopila información sobre su salud y la del bebé. Para inscribirse u obtener más información, llame al 1-877-311-8972 o ingrese en <https://mothertobaby.org/ongoing-study/dupixent/>.
- Si está amamantando o tiene planes de amamantar. Se desconoce si DUPIXENT se transmite a través de la leche materna.

Infórmele a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Sobre todo, infórmele a su proveedor de atención médica si está tomando medicamentos corticosteroides orales, tópicos o inhalados; si tiene asma y usa un medicamento para esta enfermedad; o si tiene dermatitis atópica, rinosinusitis crónica con poliposis nasal, esofagitis eosinofílica o prurigo nodular y también tiene asma. **No** cambie ni interrumpa la administración del corticosteroide u otro medicamento para el asma sin hablar con su proveedor de atención médica. Esto puede provocar el regreso de otros síntomas que fueron controlados con el corticosteroide u otro medicamento para el asma.

DUPIXENT puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Reacciones alérgicas.** DUPIXENT puede provocar reacciones alérgicas que algunas veces pueden ser fuertes. Deje de usar DUPIXENT e infórmele a su proveedor de atención médica o busque atención de emergencia de inmediato si tiene alguno de los siguientes signos o síntomas: Problemas respiratorios o sibilancias, hinchazón del rostro, los labios, la boca, la lengua o la garganta, desmayos, mareos, sensación de mareo, pulso acelerado, fiebre, urticaria, dolor en las articulaciones, malestar general, picazón, erupción cutánea, ganglios linfáticos inflamados, náuseas o vómitos, o calambres en el área del estómago.
- **Problemas oculares.** Dígame a su proveedor de atención médica si tiene nuevos problemas oculares o si nota un empeoramiento de los problemas que tenía, incluido el dolor ocular o cambios en la visión, como visión borrosa. Su proveedor de atención médica puede enviarlo a un oftalmólogo para que le realicen un examen, si es necesario.
- **Inflamación de los vasos sanguíneos.** En ocasiones poco frecuentes, esto puede ocurrir en personas con asma que reciben DUPIXENT. Puede suceder en personas que también toman un medicamento esteroide por vía oral y se detiene el tratamiento o se reduce la dosis. Se desconoce si DUPIXENT es la causa. Infórmele a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene lo siguiente: Erupción cutánea, dolor en el pecho, falta de aliento empeorado, sensación de alfileres y agujas o adormecimiento de los brazos o las piernas, o fiebre persistente.
- **Dolores en las articulaciones.** Algunas personas que usan DUPIXENT han tenido dificultades para caminar o moverse debido a los síntomas en sus articulaciones y, en algunos casos, debieron ser hospitalizadas. Infórmele a su proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma nuevo en las articulaciones o si empeoran los síntomas que tenía. Su proveedor de atención médica puede interrumpir el tratamiento con DUPIXENT si desarrolla síntomas en las articulaciones.

Los efectos secundarios más comunes incluyen los siguientes:

- **Eczema:** Reacciones en el lugar de la inyección, inflamación de los ojos y los párpados, que incluyen enrojecimiento, hinchazón y picazón, a veces con visión borrosa, y herpes en la boca o en los labios, y un alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia).
- **Asma:** Reacciones en el lugar de la inyección, alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia), dolor de garganta (dolor orofaríngeo) e infecciones parasitarias (helmintos).
- **Rinosinusitis crónica con poliposis nasal:** Reacciones en el lugar de la inyección, inflamación de los ojos y los párpados, que incluyen enrojecimiento, hinchazón y picazón, alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia), gastritis y dolor en las articulaciones (artralgia), problemas para dormir (insomnio) y dolor dental.
- **Esofagitis eosinofílica:** reacciones en el lugar de la inyección, infecciones de las vías respiratorias altas, úlceras en la boca o en los labios y dolor en las articulaciones (artralgia).
- **Prurigo nodular:** inflamación de los ojos y los párpados, que incluyen enrojecimiento, hinchazón y picazón, a veces con visión borrosa, infecciones por el virus del herpes, síntomas de resfriado común (nasofaringitis), mareos, dolor muscular y diarrea.

Infórmele a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de DUPIXENT. Llame a su médico para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios. Le recomendamos informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Utilice DUPIXENT exactamente como se lo recetó su proveedor de atención médica. Es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). DUPIXENT hasta que su proveedor de atención médica decida si usted o su cuidador puede administrar DUPIXENT. **No** intente preparar ni inyectar DUPIXENT. Infórmele a su proveedor de atención médica le haya brindado capacitación a usted o su cuidador. En niños de 6 meses a menos de 12 años, un cuidador deberá administrar DUPIXENT.

Consulte la **Información completa de prescripción adjunta, incluida la Información para el paciente.**