



DISFRUTA MÁS CON MENOS ASMA


APROBADO PARA EDADES DE 6 AÑOS O MÁS

EL MEDICAMENTO BIOLÓGICO RECETADO #1 PARA EL ASMA¹

INDICACIÓN:

DUPIXENT es un medicamento de venta con receta que se utiliza junto con otros medicamentos para el asma para el tratamiento de mantenimiento del asma eosinofílica o asma dependiente de corticosteroide orales moderada a grave en adultos y niños de 6 años de edad o más, cuya asma no se encuentra bajo control con sus medicamentos para el asma actuales. DUPIXENT ayuda a prevenir ataques (exacerbaciones) severos de asma y puede mejorar la respiración. DUPIXENT también podría ayudar a reducir la cantidad de corticosteroides orales que necesitas y, a la vez, prevenir los ataques severos de asma y mejorar la respiración. **DUPIXENT no se utiliza** para aliviar problemas respiratorios repentinos y no sustituye a un medicamento inhalado de rescate. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños de menos de 6 años que tengan asma.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

DUPIXENT[®] 
(dupilumab) Inyección
200mg · 300mg

CONOCE MÁS SOBRE EL ASMA

EL ASMA ES UNA ENFERMEDAD RESPIRATORIA QUE GENERALMENTE SE CARACTERIZA POR UNA INFLAMACIÓN CRÓNICA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS. **LOS SÍNTOMAS PODRÍAN VARIAR CON EL TIEMPO Y PUEDEN SER REVERSIBLES.**

LOS SÍNTOMAS PUEDEN INCLUIR:



FALTA DE
ALIENTO



OPRESIÓN
EN EL PECHO



SIBILANCIAS



TOS

¿QUÉ PUEDE CAUSAR LOS SÍNTOMAS DEL ASMA?

Algunos de los factores desencadenantes más comunes del asma son:

- ejercicio físico
- infecciones respiratorias
- caspa de mascotas o polvo
- irritantes como productos de limpieza o perfumes
- condiciones climáticas

Además, la inflamación subyacente puede estar presente incluso cuando no tengas síntomas.

Con tratamiento, esta inflamación en los pulmones podría reducirse, permitiéndote respirar mejor.

MIRA CÓMO PODRÍAS AHORRAR CON LA TARJETA DE COPAGO EN LA [PÁGINA 16](#)



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

No utilices este medicamento si eres alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT[®].

Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluyendo:

- si tienes una infección parasitaria (helminto)
- si tienes programado recibir alguna vacuna. No debes recibir una "vacuna viva" justo antes y durante el tratamiento con DUPIXENT.
- si estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si DUPIXENT dañará a tu bebé en gestación.
 - o Un registro de embarazos para mujeres que usan DUPIXENT durante el embarazo recopila información sobre tu salud y la de tu bebé. Para inscribirte o para obtener más información, llama al 1-877-311-8972 o visita <https://mothertobaby.org/ongoing-study/dupixent/>.
- si estás amamantando o planeas amamantar. Se desconoce si DUPIXENT se transmite a través de la leche materna.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

UNA MEJOR RESPIRACIÓN

LO QUE DUPIXENT PUEDE HACER:



BLOQUEAR UNA FUENTE CLAVE DE INFLAMACIÓN EN LOS PULMONES



AYUDAR A PREVENIR ATAQUES DE ASMA



AYUDAR A LAS PERSONAS CON ASMA A LOGRAR UNA MEJORÍA DURADERA DE LA RESPIRACIÓN



REDUCIR O ELIMINAR EL USO DE ESTEROIDES ORALES

Y con DUPIXENT solo se requieren de **1 a 2 dosis al mes***

EL
81% DE LAS PERSONAS
EXPERIMENTÓ MENOS
ATAQUES DE ASMA^{†‡}

*Dosis basada en el peso y la edad.

†En las personas con niveles altos de eosinófilos (un tipo de glóbulo blanco).


‡La tasa anual de ataques severos de asma fue de 0.20 con DUPIXENT 300 mg frente a 1.04 con placebo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

Informa a tu proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos los medicamentos de venta libre y de venta con receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.


CÓMO FUNCIONA

ANTES DE DUPIXENT



La inflamación crónica subyacente del asma podría causar que las vías respiratorias se contraigan y se estrechen, dificultando la respiración.

DESPUÉS DE DUPIXENT



DUPIXENT ayuda a reducir la inflamación subyacente.

Esta imagen únicamente ilustra el mecanismo de DUPIXENT y no refleja el efecto del tratamiento.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA DUPIXENT?

- Es un **medicamento biológico**** recetado que se dirige a una causa subyacente del asma en los pulmones
- No es un esteroide ni un inhalador

Un **medicamento biológico es un tipo de medicamento que se procesa en el cuerpo de manera diferente a los inhaladores, los medicamentos orales (pastillas) o los esteroides. Se administra mediante inyección debajo de la piel (inyección subcutánea).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

Especialmente, informa a tu proveedor de atención médica si estás tomando corticosteroides orales, tópicos o inhalados o si usas un medicamento para el asma. No cambies ni suspendas tus otros medicamentos, incluido el medicamento corticosteroid u otro medicamento para el asma, sin hablar primero con tu proveedor de atención médica. Esto puede hacer que reaparezcan otros síntomas que fueron controlados por esos medicamentos.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).

PERSONAS REALES, RESULTADOS REALES

RECETADO A MÁS DE 175,000 PACIENTES CON ASMA
¡Y EL NÚMERO SIGUE AUMENTANDO!^{†††}



Pamela

Paciente real de DUPIXENT



Lydia

Paciente real de DUPIXENT

Los resultados individuales pueden variar.

*LH Patient View: datos hasta marzo de 2025.

[†]Nuevos pacientes adultos y pediátricos de 6 años de edad o más con asma eosinofílica moderada a grave o asma dependiente de corticosteroides orales.

DISFRUTA MÁS A TU MANERA

DUPIXENT se dirige a una fuente clave de inflamación crónica de las vías respiratorias que hace que el asma sea difícil de controlar.

En múltiples estudios clínicos, las personas que usaron DUPIXENT observaron mejoras, incluyendo:

- MENOS FALTA DE ALIENTO
- MENOS SIBILANCIAS
- NO DESPERTARSE POR LA NOCHE
- MAYOR CAPACIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES NORMALES

La relación entre DUPIXENT y estos resultados fue estudiada, pero no se ha comprobado de manera definitiva.

Los efectos secundarios más comunes incluyen reacciones en el lugar de la inyección, dolor de garganta (dolor orofaríngeo) y alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia), además de infecciones parasitarias (helmintos) observadas en niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Reacciones alérgicas. DUPIXENT puede causar reacciones alérgicas que algunas veces pueden ser graves.** Deja de usar DUPIXENT e infórmale a tu proveedor de atención médica o busca atención de emergencia de inmediato si presentas alguna de las siguientes señales o síntomas: problemas respiratorios o sibilancias, inflamación del rostro, los labios, la boca, la lengua o la garganta, desmayos, mareos, sensación de mareo, pulso acelerado, fiebre, urticaria, erupción cutánea, incluyendo erupción con aspecto de ojo de buey o dolorosas protuberancias rojas o azules bajo la piel, malestar general, picazón, ganglios linfáticos inflamados, náuseas o vómitos, dolor en las articulaciones o calambres en el área del estómago.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en [inglés](#) o [español](#) que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en [inglés](#) o [español](#).



LOS NIÑOS TAMBIÉN PUEDEN DISFRUTAR MÁS

¡Déjalos jugar! Está demostrado que DUPIXENT ayuda a mejorar la función pulmonar y previene los ataques de asma en niños de 6 años o más.



DUPIXENT puede ayudar a tu hijo a respirar mejor en **apenas 2 semanas** y a lograr una **mejoría duradera de la respiración**



Los niños que usaron DUPIXENT para tratar su asma **redujeron el uso de esteroides orales**



DUPIXENT se administra en solo **1 o 2 dosis al mes***

*Dosificación basada en el peso y la edad.

Estamos contentos con la decisión que tomamos. Vale la pena que Aston reciba una inyección para ayudarle a respirar mejor y disfrutar más de las cosas que le gustan.



Aston, 9 años

Christian

Cuidadora de un paciente real de DUPIXENT/
Mamá de Aston

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

- **Inflamación de los vasos sanguíneos.** En ocasiones poco frecuentes, esto puede ocurrir en personas con asma que reciben DUPIXENT. Puede suceder en personas que también toman un medicamento corticosteroide por vía oral y se suspende el medicamento o se reduce la dosis. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si presentas lo siguiente: erupción cutánea, dolor en el pecho, falta de aliento que empeora, orina de color oscuro o marrón, fiebre persistente o una sensación de alfileres y agujas o adormecimiento de los brazos o las piernas, o fiebre persistente.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en **inglés o español** que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en **inglés o español**.

¿DEPENDES DE LOS ESTEROIDES ORALES?

Aunque podrían ser útiles cuando se recetan, el uso a largo plazo de esteroides orales puede causar:

- AUMENTO DE PESO
- CAMBIOS DE HUMOR
- HIPERTENSIÓN ARTERIAL
- DIABETES
- PROBLEMAS DE VISIÓN

Es posible que esta no sea una lista exhaustiva de los efectos secundarios relacionados con el uso de esteroides orales.

Tenía que asegurarme de llevar en mi bolsa los esteroides diarios que necesitaba para pasar el día. Desde que empecé a usar DUPIXENT, he podido reducir mi dependencia de los esteroides orales.



Tim

Paciente real de DUPIXENT

EN UN ESTUDIO DE PERSONAS DEPENDIENTES DE ESTEROIDES:

EL **86%** DE LAS PERSONAS QUE USARON DUPIXENT REDUJERON O ELIMINARON EL USO DE ESTEROIDES*†

*En un estudio clínico de pacientes de 12 años de edad o más con DUPIXENT 300 mg + tratamiento estándar (SOC, por sus siglas en inglés) frente al 68% con placebo + SOC.

†No dejes de tomar tus medicamentos corticosteroides a menos que te lo indique tu proveedor de atención médica. Esto puede hacer que reaparezcan otros síntomas que fueron controlados por el medicamento corticosteroide.

¿ESTÁS LISTO PARA PROBAR ALGO DIFERENTE?

USAR LA REGLA DE 2 PUEDE AYUDARTE A DETERMINAR QUÉ TAN BIEN CONTROLADA ESTÁ TU ASMA



- USAS UN INHALADOR DE RESCATE MÁS DE 2 VECES POR SEMANA
- HAS TENIDO 2 O MÁS CURSOS DE ESTEROIDES ORALES EN EL ÚLTIMO AÑO
- HAS TENIDO 2 O MÁS ATAQUES DE ASMA EN EL ÚLTIMO AÑO
- TE DESPIERTAS POR LA NOCHE 2 O MÁS VECES AL MES DEBIDO AL ASMA

Habla con tu médico sobre tu asma y pregunta si DUPIXENT podría ser adecuado para ti.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

- **Soriasis.** Esta puede ocurrir en personas con asma que reciben DUPIXENT. Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma nuevo en la piel. Es posible que el proveedor de atención médica lo remita a consulta con un dermatólogo para un examen si es necesario.
- **Dolor en las articulaciones.** Algunas personas que usan DUPIXENT han tenido dificultades para caminar o moverse debido a los síntomas en sus articulaciones y, en algunos casos, debieron ser hospitalizadas. Infórmele a tu proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma en las articulaciones nuevo o que empeore. Tu proveedor de atención médica podría interrumpir el tratamiento con DUPIXENT si desarrollas síntomas en las articulaciones.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en inglés o español que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en inglés o español.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

Los efectos secundarios más comunes en pacientes con asma incluyen reacciones en el lugar de la inyección, alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia), dolor de garganta (dolor orofaríngeo) e infecciones parasitarias (helmintos).

Infórmele a tu proveedor de atención médica si sufres algún efecto secundario que te cause malestar o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de DUPIXENT. Llama a tu médico para obtener consejos médicos sobre los efectos secundarios. Te recomendamos informar sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA). Visita www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en inglés o español que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en inglés o español.

HABLA CON TU MÉDICO

Utiliza estas preguntas para organizar tus pensamientos y lleva las respuestas a tu próxima cita.

EMPIEZA CON LA REGLA DE 2 PARA DETERMINAR TU NIVEL DE CONTROL



1. ¿Has usado tu inhalador de rescate más de 2 veces durante una semana típica?

Sí

No

2. ¿Has usado 2 o más cursos de esteroides orales en el último año?

Sí

No

3. ¿Has tenido 2 o más ataques de asma en el último año?

Sí

No

4. ¿Te has despertado más de 2 veces por la noche en el último mes debido al asma?

Sí

No

5. ¿Cuánto tiempo llevas teniendo síntomas de asma?

_____ Año(s) _____ Mes(es)

6. ¿Qué tratamientos te han recetado a ti o a tu ser querido para el asma?

Selecciona todas las opciones que correspondan:

Inhaladores

Antagonistas beta de acción prolongada inhalados

Esteroides inhalados

Esteroides orales

Medicamentos biológicos

Nebulizadores

Ninguno Otro _____

7. ¿Con qué frecuencia ocurren estos síntomas?

Tos

Nunca Casi nunca Ocasionalmente Frecuentemente

Sibilancias

Nunca Casi nunca Ocasionalmente Frecuentemente

Respiración rápida

Nunca Casi nunca Ocasionalmente Frecuentemente

Opresión en el pecho

Nunca Casi nunca Ocasionalmente Frecuentemente

8. ¿Has limitado o dejado de hacer alguna actividad?

Sí No

9. ¿Has notado alguno de los siguientes factores desencadenantes de tu asma?

Ácaros del polvo Jabones perfumados Mascotas
 Perfumes Contaminación del aire Moho
 Ejercicio físico Otro _____

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

Usa DUPIXENT exactamente según lo prescrito por tu proveedor de atención médica. DUPIXENT es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Tu proveedor de atención médica decidirá si tú o tu cuidador pueden inyectar DUPIXENT. **No** intentes preparar e inyectar DUPIXENT hasta que tú o tu cuidador hayan sido capacitados por tu proveedor de atención médica. En niños de 12 años o más, se recomienda que un adulto coloque o supervise la administración de DUPIXENT. A niños de 6 a menos de 12 años, el cuidador debe administrarles DUPIXENT.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en inglés o español que se acompaña, incluida la Información para el Paciente en inglés o español.

PONTE EN CONTACTO CON UN MENTOR DE ASMA

El Programa de Mentores de DUPIXENT está diseñado para ayudar a los nuevos pacientes a saber qué esperar hablando de manera individual con un paciente mentor real de DUPIXENT.

Puedes:

- CONOCER SOBRE SU EXPERIENCIA CON DUPIXENT
- HACER PREGUNTAS
- OBTENER CONSEJOS ÚTILES

Siempre que hayas hablado sobre DUPIXENT con tu médico o te hayan recetado DUPIXENT, puedes registrarte para contactar a un mentor y así conocer su recorrido y experiencia con DUPIXENT.



¿Estás interesado en hablar con un mentor o en compartir tu historia?

Si es así, llama al 1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936), opción 2.

Es fácil perder la esperanza cuando tienes dificultad para respirar. Quiero que otras personas sepan que una vez estuve en esa situación, y desearía haber tenido a alguien con quien hablar para saber que hay esperanza y una oportunidad de respirar mejor.




Rachel

Paciente Mentora de DUPIXENT MyWay[®]

APOYO A TU MEDIDA

La tarjeta de copago **DUPIXENT MyWay**[®] podría ayudar a los pacientes elegibles a cubrir los gastos de bolsillo para **DUPIXENT**.



CÓMO ACCEDER A TU TARJETA DE COPAGO

Puedes activar tu tarjeta de copago de 2 maneras:



Llama al **1-855-726-4702**

para asegurarte de que los beneficios de copago se apliquen a tu receta



Visita **DUPIXENT.com/es** para solicitar una tarjeta en línea

Una vez aprobada la tarjeta, proporciona los números de tu tarjeta de copago a la farmacia especializada cuando te llamen para programar la entrega de **DUPIXENT**. La farmacia aplicará la tarjeta para reducir tus gastos de bolsillo y anotará el número de tarjeta en tu registro para futuros reabastecimientos del medicamento.

TU COPAGO PODRÍA SER TAN BAJO COMO \$0*

EL 99% DE LOS PACIENTES CON SEGURO MÉDICO COMERCIAL ESTÁN CUBIERTOS A NIVEL NACIONAL PARA **DUPIXENT**

Los pacientes elegibles con seguro médico comercial podrían **pagar tan solo \$0*** de copago por suministro de **DUPIXENT**[®] (dupilumab). Se aplican términos y condiciones.

*Sujeto al beneficio máximo del programa por paciente por año calendario. La aprobación no está garantizada. **NO ES UN SEGURO**. No es válido para recetas pagadas, en su totalidad o en parte, por Medicaid, Medicare, VA, DOD, TRICARE u otros programas federales o estatales, incluidos los programas estatales de asistencia farmacéutica. Este programa no es válido donde lo prohíba la ley, esté sujeto a impuestos o esté restringido. **DUPIXENT MyWay** se reserva el derecho de rescindir, revocar, terminar o enmendar esta oferta, elegibilidad y términos de uso en cualquier momento sin previo aviso. Cualquier tipo de ahorro proporcionado por el programa puede variar según los costos de bolsillo de los pacientes. El programa tiene como fin ayudar a los pacientes a afrontar el costo de **DUPIXENT**. Los pacientes podrían tener planes de seguro que intentan diluir el impacto de la asistencia disponible bajo el programa. En esas situaciones, el programa podría cambiar sus términos. Se aplican términos y condiciones adicionales.

PODRÍAS SER ELEGIBLE PARA OBTENER UNA TARJETA DE COPAGO:

- si tienes seguro médico comercial
- si te recetan **DUPIXENT** para una indicación aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA)
- si eres residente de alguno de los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam, o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y eres un paciente o cuidador de 18 años de edad o más

NO ERES ELEGIBLE:

- si tienes un seguro del gobierno, como Medicaid, Medicare, Asuntos de los Veteranos, Departamento de Defensa, TRICARE u otros programas federales o estatales

SI NO ERES ELEGIBLE





DUPIXENT MyWay[®] podría ofrecerte asistencia financiera adicional.

¿TU MÉDICO TE HA RECETADO DUPIXENT[®] (dupilumab)?

Tu proveedor de atención médica es siempre tu mejor recurso para obtener información sobre DUPIXENT y deberá ser tu principal punto de contacto a lo largo del recorrido de tu tratamiento.

COMIENZA TU RECORRIDO.

Una vez que tu médico te haya recetado DUPIXENT, puedes registrarte en el programa *DUPIXENT MyWay*[®].

-  Para inscribirte, descarga el Formulario de Inscripción en www.dupixent.com/es/asma
-  Complétalo junto con tu médico, quien lo enviará por fax a *DUPIXENT MyWay* al **1-844-387-9370**
-  Llama al **1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936)** y selecciona la **opción 2** para hablar con nuestros Administradores de Casos bilingües de *DUPIXENT MyWay*
-  Si proporcionas tu dirección de correo electrónico, *DUPIXENT MyWay* puede brindarte más recursos de apoyo sobre DUPIXENT

¿TIENES PREGUNTAS SOBRE CÓMO SE INYECTA DUPIXENT?



Aprovecha nuestros **recursos complementarios para las inyecciones y videos de capacitación** en español escaneando el código QR o haciendo [clic aquí](#).

¿CÓMO PUEDE AYUDARTE *DUPIXENT MyWay*[®]?

DUPIXENT MyWay es un programa de apoyo al paciente diseñado para ayudarte a obtener acceso a DUPIXENT lo más rápido posible una vez que tengas tu receta. También te ayuda a seguir adelante con el tratamiento, ofreciéndote herramientas y recursos útiles. Si eres elegible, *DUPIXENT MyWay* puede:



Ayudarte a investigar y entender los beneficios de tu seguro médico



Encontrar maneras de ayudarte con tus gastos de bolsillo para DUPIXENT si necesitas ayuda con el copago, si tu plan de salud te niega la cobertura, o si no tienes o has perdido tu seguro médico



Conectarte con un Administrador de Casos bilingüe que responderá a tus preguntas sobre DUPIXENT y te ayudará a comenzar y mantenerte al día con tu tratamiento



Conectarte con una farmacia especializada para que tu medicamento recetado se envíe a tu hogar o ubicación preferida



Explicarte cómo guardar DUPIXENT correctamente cuando recibas tu envío




Brindarte capacitación adicional sobre inyecciones, en persona, virtualmente o por teléfono, para ayudarte a ti o a un cuidador a familiarizarse más con el método de inyección de DUPIXENT



Ofrecerte un kit para desechar agujas para su correcta eliminación



Recordarte cuándo es el momento de renovar tu receta de DUPIXENT

DUPIXENT 
(dupilumab) Inyección
200mg · 300mg

DISFRUTA MÁS CON MENOS ASMA

DUPIXENT. Una mejor respiración para ti o para tu hijo
(de 6 años de edad o más).



Escanea este código QR o haz clic aquí
para obtener más información sobre
cómo DUPIXENT puede ayudarte.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No utilices este medicamento si eres alérgico al dupilumab
o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT®.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional
de principio a fin, y la Información de Prescripción completa en inglés
o español que se acompaña, incluida la Información para el Paciente
en inglés o español.

Referencia:

1.NBRx semanal de IQVIA: datos hasta marzo de 2025.

sanofi | **REGENERON**®

La información de salud contenida en este folleto se
proporciona únicamente con fines educativos en general.
Tu médico es tu mejor fuente de información con
respecto a tu salud. Por favor, consulta con tu médico
si tienes alguna pregunta sobre tu salud o tratamiento.

© 2025 Sanofi y Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Todos
los derechos reservados. DUPIXENT y DUPIXENT MyWay
son marcas registradas de Sanofi o de una empresa afiliada.
US.DUP.25.07.0069 08/2025

