

DISFRUTA MÁS CON MENOS ASMA

APROBADO PARA EDADES DE 6 AÑOS O MÁS



EL MEDICAMENTO BIOLÓGICO RECETADO #1 PARA EL ASMA¹

INDICACIÓN: DUPIXENT es un medicamento de venta con receta que se utiliza junto con otros medicamentos para el asma para el tratamiento de mantenimiento del asma eosinofílica o asma dependiente de esteroides orales moderada a grave en adultos y niños de 6 años de edad o más, cuya asma no se encuentra bajo control con sus medicamentos para el asma actuales. DUPIXENT ayuda a prevenir ataques (exacerbaciones) severos de asma y puede mejorar la respiración. DUPIXENT también podría ayudar a reducir la cantidad de corticosteroides orales que necesitas y, a la vez, prevenir los ataques severos de asma y mejorar la respiración. **DUPIXENT no se utiliza** para aliviar problemas respiratorios repentinos y no sustituye a un medicamento inhalado de rescate. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños de menos de 6 años que tengan asma.

No utilices este medicamento si eres alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT®.

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin y la Información de Prescripción completa que se acompaña, incluida la Información para el Paciente.

DUPIXENT® 
(dupilumab) Inyección
200mg · 300mg

CONOCE MÁS SOBRE EL ASMA

LO QUE YA PODRÍAS SABER SOBRE LOS SÍNTOMAS:



**FALTA DE
ALIENTO**



**OPRESIÓN
EN EL PECHO**



SIBILANCIAS



TOS

PERO, ¿SABÍAS SOBRE LA INFLAMACIÓN?

La inflamación provoca una hinchazón que puede hacer que tus vías respiratorias se tensen y se estrechen, lo que dificulta respirar correctamente. Además, la inflamación subyacente puede seguir presente incluso cuando no tienes síntomas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluido lo siguiente:

- si tienes una infección parasitaria (helminto)
- si tienes programado recibir alguna vacuna. No debes recibir una “vacuna viva” justo antes y durante el tratamiento con DUPIXENT.
- si estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si DUPIXENT dañará a tu bebé en gestación.
 - o Un registro de embarazos para mujeres que usan DUPIXENT durante el embarazo recopila información sobre tu salud y la de tu bebé.
- si estás amamantando o planeas amamantar. Se desconoce si DUPIXENT se transmite a través de la leche materna.

PODRÍA SER EL MOMENTO DE DISFRUTAR MÁS

COMIENZA CON LA REGLA DE 2
PARA DETERMINAR TU NIVEL DE CONTROL DEL ASMA



Responder que sí incluso a 1 sola pregunta en la **REGLA DE 2** significa que tu asma podría no estar bien controlada.

- Usas un inhalador de rescate **2 O MÁS** veces por semana
- Tuviste **2 O MÁS** cursos de esteroides orales en el último año
- Tuviste **2 O MÁS** ataques de asma en el último año
- Te despiertas por la noche **2 O MÁS** veces al mes debido al asma

**HABLA CON TU MÉDICO SOBRE TU
ASMA Y PREGUNTA SI DUPIXENT PODRÍA
SER ADECUADO PARA TI.**

**MIRA CÓMO PODRÍAS AHORRAR CON EL PROGRAMA DE
TARJETA DE COPAGO DUPIXENT MyWay® EN LA PÁGINA 16**

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin y la Información de Prescripción completa que se acompaña, incluida la Información para el Paciente.

LO QUE DUPIXENT® (dupilumab) PUEDE AYUDARTE A HACER

Con DUPIXENT se requieren solo
1 o 2 dosis al mes* y puede ayudarte a:



**PREVENIR
ATAQUES
DE ASMA**



**LOGRAR UNA
MEJORÍA DURADERA
DE LA RESPIRACIÓN**



**REDUCIR O
ELIMINAR EL USO
DE ESTEROIDES
ORALES**

*Dosificación basada en el peso y la edad.

HASTA UN 81% MENOS DE ATAQUES DE ASMA^{†‡}

[†]En las personas con niveles altos de eosinófilos (un tipo de glóbulo blanco).


[‡]La tasa anual de ataques severos de asma fue de 0.20 con DUPIXENT 300 mg frente a 1.04 con placebo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: Informa a tu proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Especialmente, informa a tu proveedor de atención médica si estás usando medicamentos corticosteroides orales, tópicos o inhalados o si usas un medicamento para el asma. **No** cambies ni suspendas tus otros medicamentos, incluido el medicamento corticosteroide u otro medicamento para el asma, sin hablar con tu proveedor de atención médica. Esto puede hacer que reaparezcan otros síntomas que fueron controlados por esos medicamentos.

Y CÓMO FUNCIONA

DUPIXENT ayuda a bloquear una fuente clave de inflamación de las vías respiratorias en los pulmones.



La inflamación crónica subyacente del asma puede hacer que las vías respiratorias se contraigan y se estrechen, lo que dificulta respirar.

DUPIXENT ayuda a reducir la inflamación subyacente.

Esta imagen únicamente ilustra el mecanismo de DUPIXENT y no refleja el efecto del tratamiento.

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin y la Información de Prescripción completa que se acompaña, incluida la Información para el Paciente.

DISFRUTA MÁS A TU MANERA

En múltiples estudios clínicos, las personas que usaron DUPIXENT presentaron mejoras, entre ellas:

- MENOS FALTA DE ALIENTO
- MENOS SIBILANCIAS
- NO DESPERTARSE POR LA NOCHE
- MAYOR CAPACIDAD PARA HACER ACTIVIDADES NORMALES


La relación entre DUPIXENT y estos resultados fue estudiada, pero no se ha comprobado de manera definitiva.

Los efectos secundarios más comunes incluyen reacciones en el lugar de la inyección, dolor de garganta (dolor orofaríngeo) y alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia), además de infecciones parasitarias (helmintos) observadas en niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:
DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Reacciones alérgicas.** DUPIXENT puede causar reacciones alérgicas, incluidas reacciones en la piel, que algunas veces pueden ser graves. Deja de usar DUPIXENT e infórmale a tu proveedor de atención médica o busca atención de emergencia de inmediato si presentas alguno de los siguientes signos o síntomas: problemas respiratorios o sibilancias, inflamación del rostro, los labios, la boca, la lengua o la garganta, desmayos, mareos, sensación de mareo, pulso acelerado, fiebre, urticaria, erupción cutánea, incluyendo erupción con aspecto de ojo de buey o dolorosas protuberancias rojas o azules bajo la piel, malestar general, picazón, ganglios linfáticos inflamados, náuseas o vómitos, dolor en las articulaciones o calambres en el área del estómago.

Algunos adultos sintieron que sus
**SÍNTOMAS DE ASMA
MEJORARON EN APENAS
3 DÍAS**



**RESULTADOS DE HASTA
3 AÑOS**

Un estudio de continuación adicional hasta los 3 años analizó la seguridad y eficacia en 2,282 pacientes elegibles que completaron un estudio principal. Los pacientes recibieron 300 mg de DUPIXENT cada 2 semanas.

En este estudio, todos los investigadores sabían que los participantes recibían DUPIXENT, lo cual pudo haber influido en los resultados. Como los participantes completaron un estudio previo, los resultados podrían haber favorecido a quienes ya habían respondido bien a DUPIXENT. Los ensayos principales fueron diseñados para evitar estos sesgos.



Consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin y la Información de Prescripción completa que se acompaña, incluida la Información para el Paciente.

¿DEPENDES DE LOS ESTEROIDES ORALES?

Aunque los esteroides orales podrían ser útiles cuando se recetan, su uso a largo plazo puede causar:

Los posibles riesgos de los esteroides orales incluyen:

- AUMENTO DE PESO
- DIABETES
- CAMBIOS DE HUMOR
- PROBLEMAS DE VISIÓN
- HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Es posible que esta no sea una lista exhaustiva de los efectos secundarios relacionados con el uso de esteroides orales.

Tenía que asegurarme de llevar en mi bolsa los esteroides diarios que necesitaba para pasar el día. Desde que empecé a usar DUPIXENT, he podido reducir mi dependencia de los esteroides orales.



Tim

Paciente real de DUPIXENT
Los resultados individuales pueden variar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:
DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes: (cont.)

- **Inflamación de los vasos sanguíneos.** En ocasiones poco frecuentes, esto puede ocurrir en personas con asma que reciben DUPIXENT. Puede suceder en personas que también toman un medicamento esteroide por vía oral y se suspende el medicamento o se reduce la dosis. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si presentas lo siguiente: erupción cutánea, dolor en el pecho, falta de aliento que empeora, orina de color marrón u oscuro, fiebre persistente, o una sensación de alfileres y agujas o adormecimiento de los brazos o las piernas.

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin y la Información de Prescripción completa que se acompaña, incluida la Información para el Paciente.

DUPIXENT® (dupilumab)
ES EL ÚNICO MEDICAMENTO
BIOLÓGICO APROBADO
ESPECÍFICAMENTE PARA PACIENTES
CON ASMA DEPENDIENTES DE
ESTEROIDES ORALES



EN UN ESTUDIO DE PERSONAS
DEPENDIENTES DE ESTEROIDES:

EL

86% **DE LAS PERSONAS**
QUE USARON DUPIXENT
REDUJERON O ELIMINARON
EL USO DE ESTEROIDES*†

*En un estudio clínico de pacientes de 12 años de edad o más con DUPIXENT 300 mg + tratamiento estándar (SOC, por sus siglas en inglés) frente al 68% con placebo + SOC.

†No dejes de tomar tus medicamentos corticosteroides a menos que te lo indique tu proveedor de atención médica. Esto puede hacer que reaparezcan otros síntomas que fueron controlados por el medicamento corticosteroide.



LOS NIÑOS TAMBIÉN PUEDEN DISFRUTAR MÁS

¡Déjalos jugar! Con solo 1 o 2 dosis al mes,* DUPIXENT trabaja de manera continua para ayudar a los niños de 6 años de edad o más a:



Respirar mejor en apenas
2 semanas y lograr una mejoría
duradera de la respiración



Reducir el uso de esteroides orales[†]



Tener menos ataques de asma[‡]

*Dosificación basada en el peso y la edad.

[†]No dejes de tomar tus medicamentos corticosteroides a menos que te lo indique tu proveedor de atención médica. Esto puede hacer que reaparezcan otros síntomas que fueron controlados por el medicamento corticosteroide.

[‡]La tasa anual de ataques severos de asma fue de 0.24 con DUPIXENT 200 mg frente a 0.67 con placebo.

Los resultados de seguridad de DUPIXENT observados en niños hasta la Semana 52 fueron similares al perfil de seguridad de los estudios en adultos y adolescentes con asma moderada a grave, con la adición de infecciones parasitarias (helminths).

Como mamá, era realmente aterrador ver a Zeke pasar por un ataque de asma. Al recordar ese tiempo, desearía haber actuado antes, sabiendo lo que sé hoy.



Zeke, 8 años

Ashley

Cuidadora de un paciente real de DUPIXENT/Mamá de Zeke

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes: (cont.)

- **Psoriasis.** Esto puede ocurrir en personas con asma que reciben DUPIXENT. Informa a tu proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma nuevo en la piel. Tu proveedor de atención médica podría remitirte a un dermatólogo para que te examine, si es necesario.
- **Dolor en las articulaciones.** Algunas personas que usan DUPIXENT han tenido dificultades para caminar o moverse debido a los síntomas en sus articulaciones y, en algunos casos, debieron ser hospitalizadas. Infórmale a tu proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma en las articulaciones nuevo o que empeore. Tu proveedor de atención médica podría interrumpir el tratamiento con DUPIXENT si desarrollas síntomas en las articulaciones.

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin y la Información de Prescripción completa que se acompaña, incluida la Información para el Paciente.

HABLA CON TU MÉDICO

Utiliza estas preguntas para organizar tus ideas y lleva las respuestas a tu próxima cita.

COMIENZA CON LA REGLA DE 2 PARA DETERMINAR TU NIVEL DE CONTROL DEL ASMA



1. ¿Usas tu inhalador de rescate 2 o más veces durante una semana típica?

☐ Sí ☐ No

2. ¿Has usado 2 o más cursos de esteroides orales en el último año?

☐ Sí ☐ No

3. ¿Has tenido 2 o más ataques de asma en el último año?

☐ Sí ☐ No

4. ¿Te has despertado 2 o más noches en el último mes debido al asma?

☐ Sí ☐ No

5. ¿Cuánto tiempo llevas teniendo síntomas de asma?

_____ Año(s) _____ Mes(es)

6. ¿Qué tratamientos te han recetado a ti o a tu ser querido para el asma?

Selecciona todas las opciones que correspondan:

☐ Inhaladores ☐ Nebulizadores
☐ Medicamentos biológicos ☐ Esteroides inhalados
☐ Esteroides orales ☐ Antagonistas beta de acción prolongada
☐ Ninguno ☐ Otro _____

7. ¿Con qué frecuencia ocurren estos síntomas?

Tos

☐ Nunca ☐ Casi nunca ☐ Ocasionalmente ☐ Frecuentemente

Sibilancias

☐ Nunca ☐ Casi nunca ☐ Ocasionalmente ☐ Frecuentemente

Respiración rápida

☐ Nunca ☐ Casi nunca ☐ Ocasionalmente ☐ Frecuentemente

Opresión en el pecho

☐ Nunca ☐ Casi nunca ☐ Ocasionalmente ☐ Frecuentemente

Mucosidad excesiva

☐ Nunca ☐ Casi nunca ☐ Ocasionalmente ☐ Frecuentemente

8. ¿Has limitado o dejado de hacer alguna actividad?

☐ Sí ☐ No

9. ¿Has notado alguno de los siguientes factores desencadenantes de tu asma?

☐ Ácaros del polvo ☐ Contaminación del aire ☐ Mascotas ☐ Moho
☐ Perfumes ☐ Jabones perfumados ☐ Ejercicio físico
☐ Otro _____

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: Los efectos secundarios más comunes en pacientes con asma incluyen reacciones en el lugar de la inyección, alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia), dolor de garganta (dolor orofaríngeo) e infecciones parasitarias (helmintos).

Infórmale a tu proveedor de atención médica si sufres algún efecto secundario que te cause malestar o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de DUPIXENT. Llama a tu médico para obtener consejos médicos sobre los efectos secundarios. Te recomendamos informar sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA). Visita www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088.

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin y la Información de Prescripción completa que se acompaña, incluida la Información para el Paciente.

PONTE EN CONTACTO CON UN MENTOR DE DUPIXENT PARA EL ASMA

El Programa de Mentores de DUPIXENT está diseñado para ayudar a los nuevos pacientes a saber qué esperar del tratamiento, hablando de manera individual con un paciente mentor real de DUPIXENT.

Puedes:

- CONOCER SOBRE SU EXPERIENCIA CON DUPIXENT
- HACER PREGUNTAS
- OBTENER CONSEJOS ÚTILES



¿Estás interesado en hablar con un mentor
o en compartir tu historia?

Si es así, llama al 1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936),
opción 2.

Siempre que ya hayas hablado sobre DUPIXENT con tu médico o te hayan recetado DUPIXENT, puedes registrarte para ponerte en contacto con un mentor y así conocer sobre su recorrido y experiencia con DUPIXENT.

Una enfermera en el consultorio de mi médico me guió durante mi primera dosis y me mostró cómo es el proceso de inyección. Después de eso, me sentí cómodo administrándome las inyecciones en casa.



Bill

Paciente real de DUPIXENT

CÓMO SE ADMINISTRA DUPIXENT® (dupilumab)

DUPIXENT se administra mediante inyección debajo de la piel (inyección subcutánea). DUPIXENT debe mantenerse en el refrigerador y puede retirarse para administrarse a temperatura ambiente (hasta 77 °F/25 °C) y puede conservarse hasta 14 días. Recuerda siempre revisar las Instrucciones de Uso completas antes de inyectar.

Se requieren 1 o 2 dosis al mes.*

*Según el peso y la edad.


DÓNDE SE ADMINISTRA DUPIXENT

Administra la inyección subcutánea en:

- El área exterior de la parte superior de los brazos
solo si un cuidador administra la inyección
- Abdomen y muslos
excepto en las 2 pulgadas alrededor del ombligo

Elige un lugar de inyección diferente cada vez que inyectes DUPIXENT.

No lo inyectes en zonas de la piel sensibles, dañadas, con moretones o con cicatrices.




ESCANEA EL CÓDIGO
O HAZ [CLIC AQUÍ](#) PARA
OBTENER APOYO ADICIONAL
PARA LAS INYECCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: Usa DUPIXENT exactamente como te lo recetó tu proveedor de atención médica. DUPIXENT es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Tu proveedor de atención médica decidirá si tú o tu cuidador pueden inyectar DUPIXENT. No intentes preparar e inyectar DUPIXENT hasta que tú o tu cuidador hayan sido capacitados por tu proveedor de atención médica. En niños de 12 años o más, se recomienda que un adulto coloque o supervise la administración de DUPIXENT. A niños de 6 a menos de 12 años, un cuidador debe administrarles DUPIXENT.

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin y la Información de Prescripción completa que se acompaña, incluida la Información para el Paciente.

APOYO A TU MEDIDA

DUPIXENT MyWay® podría ayudarte con los costos de tu tratamiento con DUPIXENT.



ACTIVACIÓN DE TU TARJETA DE COPAGO

Puedes acceder a tu tarjeta de copago de 2 maneras:



Llama al 1-855-726-4702.

Para garantizar que los beneficios de copago se apliquen a tu receta, asegúrate de tener el número de grupo y los números de identificación que se encuentran en la tarjeta de copago



Visita [DUPIXENT.com/es](https://www.dupilumab.com/es) para activar la tarjeta

Si estás activando una tarjeta de copago, asegúrate de darle los números de tu tarjeta de copago a tu farmacia especializada. Puedes llamarlos o compartir la información cuando te llamen para programar la entrega de DUPIXENT.

La farmacia aplicará la tarjeta para reducir tus gastos de bolsillo con cada suministro de DUPIXENT, según el límite máximo anual del programa y otros términos y condiciones.

PODRÍAS PAGAR TAN SOLO \$0* DE COPAGO POR DUPIXENT® (dupilumab)

EL 99% DE LOS PACIENTES CON SEGURO MÉDICO COMERCIAL ESTÁN CUBIERTOS A NIVEL NACIONAL PARA DUPIXENT

Si tienes un seguro médico comercial, podrías ser elegible para pagar **tan solo \$0* de copago** por cada suministro de DUPIXENT a través del Programa de Tarjeta de Copago DUPIXENT MyWay.

*Sujeto al beneficio máximo del programa por paciente por año calendario. La aprobación no está garantizada. **NO ES UN SEGURO.** No es válido para recetas pagadas, en su totalidad o en parte, por Medicaid, Medicare, VA, DOD, TRICARE u otros programas federales o estatales, incluidos los programas estatales de asistencia farmacéutica. Este programa no es válido donde lo prohíba la ley, esté sujeto a impuestos o esté restringido. **DUPIXENT MyWay** se reserva el derecho de rescindir, revocar, terminar o enmendar esta oferta, elegibilidad y términos de uso en cualquier momento sin previo aviso. Cualquier tipo de ahorro proporcionado por el programa puede variar según los costos de bolsillo de los pacientes. El programa tiene como fin ayudar a los pacientes a afrontar el costo de DUPIXENT. Los pacientes podrían tener planes de seguro que intentan diluir el impacto de la asistencia disponible bajo el programa. En esas situaciones, el programa podría cambiar sus términos. Se aplican términos y condiciones adicionales.

PODRÍAS SER ELEGIBLE PARA OBTENER UNA TARJETA DE COPAGO:

- si tienes seguro médico comercial, incluidos los intercambios de seguros de salud, planes para empleados federales o planes para empleados estatales
- si te recetan DUPIXENT para una indicación aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA)
- si eres residente de alguno de los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos

SI NO ERES ELEGIBLE

DUPIXENT MyWay puede hablar contigo sobre las opciones de asistencia financiera que podrían estar disponibles para ti.

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin y la Información de Prescripción completa que se acompaña, incluida la Información para el Paciente.

COMIENZA CON *DUPIXENT MyWay*®

PUEDES INSCRIBIRTE DE 2 MANERAS:

- Tu proveedor de atención médica puede completar contigo el formulario de inscripción. Tú y tu médico deben completar el formulario de inscripción y firmarlo donde se indica. Luego, tu médico puede enviar el documento por fax o subirlo electrónicamente
- Si tu médico aún no te ha inscrito, comunícate con nosotros directamente al **1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936)**, **opción 2**, para hablar con nuestros Administradores de Casos bilingües de *DUPIXENT MyWay*, de lunes a viernes, de 8 am a 9 pm ET

Tu proveedor de atención médica es siempre tu mejor recurso para obtener información sobre *DUPIXENT* y deberá ser tu principal punto de contacto a lo largo del recorrido de tu tratamiento.

¿CÓMO PUEDE AYUDARTE *DUPIXENT MyWay*?

DUPIXENT MyWay es un programa de apoyo al paciente diseñado para ayudarte a obtener acceso a *DUPIXENT* lo más rápido posible una vez que tengas tu receta. También te ayuda a seguir adelante con el tratamiento, ofreciéndote herramientas y recursos útiles. Si eres elegible, *DUPIXENT MyWay* puede:

-  Investigar y revisar contigo los beneficios de tu seguro médico para ayudarte a entender cuáles podrían ser tus gastos de bolsillo para *DUPIXENT*.
-  Ponerte en contacto con un enfermero educador, quien puede ofrecer capacitación complementaria para las inyecciones en persona, por teléfono o de manera virtual.
-  Ponerte en contacto con pacientes mentores de *DUPIXENT* capacitados, para que escuches sobre sus recorridos personales con *DUPIXENT* y converses con ellos sobre sus experiencias.
-  Brindarte acceso a la aplicación *MyWay* para ayudarte a manejar tu experiencia con *DUPIXENT* directamente desde tu teléfono móvil.
-  Proporcionarte un recipiente para desechar objetos punzantes para la eliminación segura de las agujas.
-  Recordarte cuándo debes reabastecer tu medicamento recetado y administrar tu siguiente dosis.



Consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin y la Información de Prescripción completa que se acompaña, incluida la Información para el Paciente.

¿SABÍAS QUE...?

DUPIXENT también está aprobado por la FDA para tratar otras 8 afecciones:



Dermatitis atópica
Eczema moderado a grave no controlado
Para edades de 6 meses o más



Rinosinusitis crónica con pólipos nasales
No controlada
Para edades de 12 años o más



Esofagitis eosinofílica
Para edades de 1 año o más, con un peso de al menos 33 lb (15 kg)



Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
No controlada adecuadamente y con un número elevado de eosinófilos en sangre
Para edades de 18 años o más



Prurigo nodular
Para edades de 18 años o más

DUPIXENT no se utiliza para aliviar problemas respiratorios repentinos y no sustituye a un medicamento inhalado de rescate.



Urticaria crónica espontánea (UCE)
con ronchas no controladas con antihistamínicos H1
Para edades de 2 años o más



Rinosinusitis fúngica alérgica
Para edades de 6 años o más, en personas que ya han sido sometidas a cirugía sinusal.



Penfigoide ampollosa (PA)
Para edades de 18 años o más



Escanea el código o haz [clic aquí](#) para obtener más información sobre cómo DUPIXENT puede ayudarte.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: No utilices este medicamento si eres alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT®.

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional de principio a fin y la [Información de Prescripción completa](#) que se acompaña, incluida la [Información para el Paciente](#).

Referencia: 1. Datos de IQVIA NBRx hasta marzo de 2026.

sanofi | REGENERON®

La información de salud contenida en este folleto se proporciona únicamente con fines educativos en general. Tu médico es tu mejor fuente de información con respecto a tu salud. Por favor, consulta con tu médico si tienes alguna pregunta sobre tu salud o tratamiento.

© 2026 Sanofi y Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Todos los derechos reservados. DUPIXENT y DUPIXENT MyWay son marcas registradas de Sanofi o de una empresa afiliada. US.DUP.26.05.0182 07/26